Session n°5 : jeunes Chirurgiens en collaboration avec AJCV

Eventrations Lombaires et lombo-fessières

Y. RENARD, C. AVISSE, J.P. PALOT

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS
SERVICE DE CHIRURGIE GÉNÉRALE,
DIGESTIVE ET ENDOCRINIENNE

Laboratoire d'Anatomie
Faculté de Médecine de Reims

Anatomie

DH/Av : muscle oblique externe

DD/Arr : muscle érecteur du rachis

Anatomie

Ht : 12ème côte

Bas : crête iliaque

Triangle lombaire inférieur
(Jean-Louis Petit)

Triangle lombaire supérieur
(Quadrilatère de Grynfelt)

Anatomie

Introduction

E H S			
Incisional Hernia Classification			
Midline	subxiphoidal	M1	
	epigastric	M2	
	umbilical	M3	
	infraumbilical	M4	
	suprapubic	M5	
Lateral	subcostal	L1	
	flank	L2	
	iliac	L3	
	lumbar	L4	
Recurrent incisional hernia?		Yes ☐	No ☐
length:	cm	width:	cm
Width cm	W1	W2	W3
	<4cm ☐	≥ 4-10cm ☐	≥10cm ☐

"latéro-dorsal de la ligne axillaire antérieure"
 "defect of the posterolateral abdominal wall"

Littérature

Avant 1950 :

10 cas

Après 1950

34 cas

Littérature

Lal R. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2014.	Etude rétrosp. → 5 lombaires / 185 latérales
Veyrie N. World J Surg. 2013	61 Ev lat. → “Lumbar I.H. was excluded”
Do MV. Ochsner J. 2012.	Etude rétrosp. → 5 cas
Yavuz N. Hernia. 2009.	Etude rétrosp. → 7 cas
Palanivelu C. Hernia. 2008.	Etude rétrosp. → 11 cas sur 10 ans

Management of non-midline incisional hernia by the laparoscopic approach: results of a long-term follow-up prospective study

Alfredo Moreno-Egea · Andres Carrillo-Alcaraz

Seule étude prospective, coelio, 33 lombaires / 73 patients

Classification et épidémiologie

**Prévalence après lombotomie
20-30%**

- Néphrectomie
- Rupture traumatique
- Greffon d'os iliaque
- Résection de tumeur pariétale abdo.
- Anévrisme aortique abdo.
- Reconstruction par lambeau de grand dorsal

*Shekarriz B. J Urol. 2001.
Sakarya A. Surg Endosc. 2003.
Alfredo Moreno-Egea. JAMA. 2007.
Palanivelu C. Hernia. 2008.*

Physiopathologie (prev: 20-30%)

Physiopathologie (prev: 20-30%)

Urol Oncol. 2004 Jan-Feb;22(1):36-9.

Permanent flank bulge is a consequence of flank incision for radical nephrectomy in one half of patients.

Chatterjee S¹, Nam R, Fleshner N, Klotz L.

Dénervation
"flank bulging"

Variable selon les séries
13 – 50 %

Technique chirurgicale

Eventration rare : pas de technique standard

Voie médiane ou lombaire ?

Quel plan ?

Quelle prothèse ?

Quelle marge ?

Quelle fixation et où fixer ?

Repair of Large Diffuse Lumbar Hernias by an Extraperitoneal Binder Technique
Volume 151, April 1986

Irving L. Lichtenstein, MD, FACS, Los Angeles, California

Principes

Large prothèse qui dépasse largement

Fixation : loin en arrière, sur le muscle psaos

Principe de Pascal

Technique chirurgicale

En arrière et en bas

Technique chirurgicale

Patient sondé. DL cassé. Billot flanc. Sanglage.

Pas d'ouverture du péritoine, passage rétro-péritonéal.

Technique chirurgicale

Exposition du muscle psoas.
En bas, exposition espace de Bogros et Retzius.
En haut, jusqu'aux dernières côtes.

Technique chirurgicale

Technique chirurgicale

Repérage :

- Uretère
- Vaisseaux gonadiques
- Nerf fémoral

Technique chirurgicale

Fixation de la prothèse
au muscle psoas en arrière.

Technique chirurgicale

Roulis contro-latéral pour couvrir et fixer la prothèse par la masse viscérale.

Technique chirurgicale

Fixation postérieure trans-musculaire à l'aiguille de Reverdin.

Au ligament de Cooper si nécessaire.

A travers les dernières côtes en haut.

Technique chirurgicale

Position finale de la prothèse

Voie ouverte / Cœlioscopie ?

Table 1. Classification of Lumbar Hernias Into 4 Types Based on 6 Criteria*

Characteristic	A	B	C	D (Pseudohernia)
Size, cm	<5	5-15	>15	
Location	Superior	Inferior	Diffuse	
Contents	EP fat	Visceral	Visceral	
Etiology	Spontaneous	Incisional	Traumatic	
Muscular atrophy	No (minor)	Mild	Severe	Severe
Recurrence	No	Yes (open)	Yes (laparoscopy)	
Surgical approach	Open approach EP, TEP laparoscopy	IP laparoscopy	Open approach	Open approach (double mesh)

**Retente des muscles
(surtout si déviation)
➔ Voie ouverte !!**

*Moreno-Egea A. Arch Surg. 2007
Moreno-Egea A. Surg Endosc. 2012*

Série rémoise

Rétrospective
Eventrations lombaires
Janvier 2009 – Janvier 2015
Technique identique, voie ouverte
31 patients
Suivi 17 mois

Série rémoise (moyenne, bornes)

Patients	31
Age (an)	59,8 (23-77)
Sexe	16 H, 15 F
BMI (kg/m ²)	30 (20,7 – 46)

Série rémoise

Nombre de patients par comorbidités

Nombre de patients (%) selon le stade VHWG

Série rémoise

Etiologies

Dénervation (%)

Série rémoise

Morbidité spécifique opératoire

Série rémoise

Résultats à long terme

Conclusion

Rare (20% des éventrations latérales)

Le bon plan, prothèse large (5 cm en arrière)

Suture par apposition sur le psoas

**Dénervation associée++ : traiter en même temps que
l'éventration**

Session n°5 : jeunes Chirurgiens en collaboration avec AJCV

Eventrations Lombaires et lombo-fessières

Y. RENARD, C. AVISSE, J.P. PALOT

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS
SERVICE DE CHIRURGIE GÉNÉRALE,
DIGESTIVE ET ENDOCRINIENNE

Laboratoire d'Anatomie
Faculté de Médecine de Reims